

**UMC St Radboud**

# **Cerclage**

**Patiënteninformatie**

*In overleg met uw behandelend arts overweegt u een operatie op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Universitair Medisch Centrum (UMC) St Radboud. De ingreep heet cerclage: het plaatsen van een bandje om de baarmoedermond. In deze folder vindt u informatie over de operatie. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de behandelend arts.*

## **Indicatie**

De meest voorkomende reden voor een cerclage is het onvermogen van de baarmoedermond om de zwangerschap tot het einde uit te dragen. Het aanleggen van een bandje rondom de baarmoedermond kan in deze gevallen van grote waarde zijn om vroeggeboorte te voorkomen.

## **Anesthesie**

### *Vaginale cerclage*

Als de operatie vaginaal plaatsvindt, kan worden gekozen voor lokale anesthesie (plaatselijke verdoving), een ruggenprik (epidurale/spinale anesthesie) of een algehele anesthesie. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de situatie van de baarmoedermond en van uw wens.

### *Buikcerclage*

Bij een cerclage via de buikwand (transabdominale cerclage) wordt altijd algehele toegepast om de ingreep technisch zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

\* Aangezien de operatie plaatsvindt nadat de aanleg van de organen van de baby is voltooid, is een algehele anesthesie niet schadelijk voor uw baby.

## **Operatie**

### *Vaginale cerclage*

Een vaginale operatie wordt verricht rond een zwangerschapsduur van veertien weken. Na verdoving van de bekkenbodem wordt de baarmoedermond voorzichtig vastgenomen met instrumenten, waarna een stevige, niet-oplosbare draad rondom de baarmoedermond wordt gelegd.

Bij lokale anesthesie kunt u na enkele uren naar huis, bij een ruggenprik of algehele anesthesie na een dag.

### *Buikcerclage*

Ook een buikcerclage vindt plaats bij een zwangerschap van veertien weken. Via deze buikoperatie kan het bandje veel hoger om de baarmoedermond worden aangelegd. Daardoor kan de

baarmoedermond niet meer open gaan staan.

De ziekenhuisopname bedraagt ongeveer vijf dagen.

## **Beloop tijdens zwangerschap**

### *Vaginale cerclage*

- Bij vertrek uit het ziekenhuis wordt door middel van echoscopie gekeken naar de conditie van de baby.
- Na de ingreep treedt altijd licht vaginaal bloedverlies op, dit is niet schadelijk voor de baby en houdt na ongeveer een week op.
- Bij opnieuw optreden van bloedverlies is het raadzaam u zo spoedig mogelijk te laten controleren. Ook bij vochtverlies (vruchtwater) moet u contact opnemen met de polikliniek.
- Het bandje dat is aangelegd wordt weer verwijderd bij een zwangerschapsduur van ongeveer 37 weken. Dit gebeurt op de polikliniek. Het verwijderen doet geen pijn en kan zonder anesthesie plaatsvinden. Over het algemeen komt de bevalling niet meteen na verwijdering van het bandje op gang.

### *Buikcerclage*

- Na zestien weken zwangerschapsduur treden soms samentrekkingen van de baarmoeder op die op weeën lijken. Deze worden veroorzaakt door het tegengaan van het openen van de baarmoedermond door het aangelegde bandje. Neem in dit geval steeds contact op met uw behandelend arts.
- Bij bloed- of vochtverlies moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de dienstdoende arts van de afdeling Obstetrie en Gynaecologie. Over het algemeen is bloedverlies niet schadelijk voor de baby.
- Na een buikcerclage is het nodig de baby geboren te laten worden via een keizersnede. Het bandje kan namelijk niet meer worden verwijderd (en doet dus ook dienst in een eventuele volgende zwangerschap). De keizersnede vindt plaats bij een zwangerschapsduur van ongeveer 38 weken.

## **Adres**

### *Bezoekadres*

Polikliniek Verloskunde en  
Gynaecologie  
UMC St Radboud centraal  
Geert Groteplein 10, route 782  
Nijmegen

### *Telefoonnummer*

Tijdens kantooruren: 024 - 361 47 88  
's Avonds en in  
het weekend: 024 - 361 66 77

© UMC St Radboud  
overname van (gedeelten uit)  
deze tekst is uitsluitend  
mogelijk na schriftelijke  
toestemming van  
Staf Concerncommunicatie